

Nagy hőscincér

(*Cerambyx cerdo*)



A nagy hőscincér szaproxilofág bogárfaj. Hegy- és dombvideki tölgyesek, síksági keményfaligetek, fáslegelők és parkok lakója. Legnagyobb számban ott található, ahol igen öreg, magányos vagy kisebb csoportokban álló tölgyfajok élnek. Csak azokat a sérült, de még élő fákat támadja meg, amelyek törzsét legalább részben erősen süti a nap. Ezért zárt erdőkben inkább csak a szegélyekben vagy nyiladékokban, illetve a lombkorona vastag ágaiban telepszik meg. Fáslegelőkön azonban egészen a talajszintig leérnek az imágók rönnyílásai. A nagy hőscincér 2,5 - 6 centiméter hosszú, színe feketés-barnásvörös átmenettel a szárnycsúcs felé. Európa egyik legszebb és legnagyobb bogara. Alkonyatkor és éjszaka aktív. Az imágók a tölgyek kifolyó nedveivel táplálkoznak. A cincér lárvái kb. 2 évig a fakéreg alatt élnek, később a tölgyek élő farészébe is berágják magukat. A nagy hőscincér Magyarországon védett és natura 2000 jelölő faj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Skarlátbogár

(*Cucujus cinnaberinus*)



A skarlátbogár Magyarországon nem ritka, de Európa többi országában állománya nagyon megritkult. Az imágó színe cinóbervörös, teste megnyúlt, lapos és párhuzamos oldalú. Testhossza 10-15 mm. Lárvája szintén lapos, borostyánsárga színű, 15-20 mm hosszú. A skarlátbogár hazánkban az erdős területeken gyakorlatilag mindenütt megtalálható. Lárvája a nem rég (1-2 év) elpusztult fatörzsek (lombosfák és fenyők) elváló, de még nem túl laza kérge alatt fejlődik, az elhalt kambiummal táplálkozik, de alkalomadtán más rovarok lárváit is elfogyasztja, a rövid életű kifejlett imágó. A skarlátbogár védett és Natura 2000 jelölő faj is egyben, természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Orrszarvúbogár

(*Oryctes nasicornis*)



Az orrszarvúbogár 2,5-4 cm-es testhosszával és fénylő vörösesbarna színezetével igen impozáns megjelenésű rovar. Nevét a hímek fejének elülső részén található hajlott nyúlványról kapta. A szaporodás nyár elején zajlik, az egyébként ritkán repülő bogarak alkonyatkor szárnyra kelnek, hogy párt válasszanak. Lomha, nehézkes röptük miatt könnyen eshetnek a lappantyú, a kuvik és a denevérek áldozatául. Az orrszarvúbogár öreg tölgyerdőkben él, a pajorok (lárvák) az idős fák korhadó anyagában fejlődnek és 4-5 év után válnak kifejletté. Az orrszarvúbogár állománya is megritkult, éppen az öreg erdőállományok csökkenése miatt. Az orrszarvúbogár védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

